

Clauilia laminata Mtg. sp. Ei; Kr, nicht selten; Gm; die
f. minor Rssm. bei O.

„ *orthostoma* Mke. Ei.

„ *biplicata* Mtg. sp. Gm, B und HS.

„ *parvula* Stud. O und HS.

„ *dubia* Drap. O.

„ *plicatula* Drap. Ei, O und Kr.

„ *lineolata* Hld. Ei und O.

„ *ventricosa* Drap. Ei und O.

Carychium minimum Müll. O.

Acme polita Hrtm. O.

„ *lineata* Drp. sp. O.

Limneus truncatulus L. O.

Zur Fauna des Elsasses.

Als einen weiteren Beitrag zur Molluskenfauna des Elsasses erlaube ich mir das Verzeichniss derjenigen Schneckenarten zu geben, welche ich auf meinen Ausflügen im Elsass in diesem und verflossenem Jahre zu sammeln die Gelegenheit hatte. Im Wesentlichen wird nachfolgende Liste mit dem Verzeichniss A. Morlets, sowie mit den hierhergehörigen Meyer'schen Aufzählungen übereinstimmen, immerhin dürfte ihr aber die Erwähnung einiger neuer Fundorte wie auch das Vorkommen von *Pupa alpestris* und *Hyalinia diaphana*, die meines Wissens im Elsass noch nicht gefunden wurden, ein gewisses Interesse verleihen.

Vor allem fühle ich mich hier noch verpflichtet, Hrn. Dr. O. Boettger gebührenden Dank dafür auszusprechen, dass er die Güte besass, mir bei der Bestimmung der schwierigen Arten behülflich zu sein.

Folgende Fundorte sind zu nennen:

1. Ruine Hugstein bei Gebweiler (Sandstein).
2. R. Hohlandsburg b. Colmar.

3. R. Flixburg bei Colmar.
 4. R. Hohnack bei Colmar (Sandstein).
 5. Retournemer Hoch Vogesen.
 6. Weg vom Hohneck nach Münster H. Vg.
 7. Bonhomme (Diedolshausen).
 8. Rappoltsweiler (im Thal).
 9. R. Hochköngsburg b. Schlettstadt (Sandstein).
 10. R. Frankenburg b. Schlettstadt (768 m hoch gelegen).
(Sandstein).
 11. R. Bernstein b. Dambach (Granit).
 12. R. Andlau b. Barr.
 13. Spesburg b. Barr (Granit).
 14. Hohwald und Umgebung.
 15. Abhang des Hochfelds.
 16. R. Kagenfels b. St. Odile.
 17. R. Birkenfels b. St. Odile (Sandstein).
 18. R. Hagelschloss b. St. Odile.
 19. R. Lützelburg b. Ottrott (Sandstein).
 20. R. Rathsamhausen b. Ottrott (Sandstein).
 21. Weg von Rosheim nach Girbaden (Kalk).
 22. R. Girbaden (Sandstein).
 23. R. Ringelstein b. Oberhaslach (Sandstein).
 24. R. Niedeck.
 25. Wangenburger Thal.
 26. R. Wangenburg.
 27. R. Hohbarr b. Zabern (Sandstein).
 28. R. Gr. Geroldseck b. Zabern (Sandstein).
 29. R. Greiffenstein b. Zabern (Sandstein).
 30. Rhein-Marne-Kanal unweit Zabern.
 31. R. Lützelburg unweit Zabern.
 32. Strassburg, besonders bei Reichstett, im Illkircher Wald
und im Rheinwäldchen.
- Die gesammelten Arten sind:
1. Vitrina major Fér. 2, 3, 5, 6, 18 h., 26, 28, 29.

2. *Vitrina pellucida* M. 9, 18, 27, 28.
3. *Hyalinia cellaria* M. 4*, 10*, 11, 18 h., 21, 27 h., 29, 31, 32. *Hier sehr grosse Exemplare.
4. *H. nitens* Mich. 10, 32.
5. *H. nitidula* Dr. 1, 3, 9, 18 h., 21 h.
6. *H. pura* Ald. 4, 9, 18, 28.
7. *H. hammonis* St. 32.
8. *H. crystallina* typ. M. 3, 6, 10, 18.
9. *H. diaphana* St. 1.
10. *H. nitida* M. 32.
11. *Patula rotundata* M. 4, 5 h.; 6 h.; 9, 10, 16, 17 h.; 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 32.
12. *Pt. pygmaea* Dr. 2, 23.
13. *Acanthinula aculeata* M. 1 St. stark gerippt, mit schwachen Dornen 9.
14. *Vallonia pulchella* M. 1, 2, 3, 9, 11, 13, 23 h.; 29.
15. *V. costata* M. 1, 2, 3, 9, 11 h.; 23 h.; 26, 27, 29, 31.
16. *Helix obvoluta* M. 1 h.; 4, 9, 10, 16, 18, 19, 22 h.; 23, 24, 28, 32.
17. *Hx. personata* M. 9, 10, 18, 24.
18. *Hx. sericea* Dr. 2, 3, 9, 27, 29, 32.
19. *Hx. plebeja* Dr. 9, 10, 14, 25.
20. *Hx. hispida* L. 1, 10, 11, 12, 16, 21, 24 sehr grosses Exemplar; 32.
21. *Hx. rufescens* var. *Putonii* Cl. 19, 20.
22. *Hx. fruticum* L. 21, 32.
23. *Hx. carthusiana* M. 32.
24. *Hx. incarnata* M. 3, 9, 21 h.; 23, 24, 32.
25. *Hx. lapicida* L., fast überall häufig, von 16 ein albines Stück.
26. *Hx. ericetorum* M. 21 h.; 22.
27. *Hx. arbustorum* L. 5, 6, 9, 14 h. und äusserst dünn-schalig; 26.
28. *Hx. hortensis* M. 9, 14, 21, 32 h.

Folgende Bändervarietäten: 00,000, 12345,
12,345.

29. *Hx. nemoralis* L. 6, 10, 14, 21, 23, 27, 32 h.
Folgende Bändervarietäten: 00,000 (gelb und
roth); 00,300, 10,300, 12,300, 12,305,
12,345, 12,345.
30. *Hx. pomatia* L. 10, 21 h.; 22, 32 h.
31. *Bulimus detritus* M. 21 h.
32. *B. montanus* Dr. 10, 14 h.; 16 h.; 24.
33. *B. obscurus* M. 1—4, 9, 10, 13, 16 h.; 18—23, 26—29.
34. *Cionella lubrica* K. 3, 1 St.; 23, 32.
forma minima 27, 29 h.; 31 h.
35. Pupa doliolum Br. 10 stark gerippte, braune Exemplare,
alle lebend.
36. *P. muscorum* L. 1—3, 23 h.; 26—29, 31, 32.
37. *P. minutissima* H. 1, 27.
38. *P. alpestris* A. 23, 25, 27; röthliche Färbung und
schwacher oberer Gaumenzahn.
39. *Balea perversa* L. 1—4, 11, 13, 19, 20, 24, 26, 27, 31.
40. *Clausilia laminata* M. 5, 9, 10, 14 h.; 15, 16, 18, 27,
28, 32.
41. *Cl. lineolata* H. 5, 10 z. h.
42. *Cl. plicatula* Dr., weitaus die häufigste Clausilie in den
Vogesen, fast auf allen Ruinen in Menge.
43. *Cl. dubia* Dr. 4, 9 h.; 10 h.; 14, 17 h.; 28, 29 h.;
31, von hier ein albines Exemplar.
44. *Cl. bidentata* (nigricans P.) 1, 2, 4, 5 h.; 9 h.; 12,
14, 16 h.; 17.
a. var. *septentrionalis* Schmidt, 3, 6, 9, 15, oft
mit Beziehungen zu *parvula*.
b. var. *gracilior* Jef. (*elongata* Cl.) 3, 9, 16.
45. *Cl. parvula* St. 10, 9, 16 h.; 27.
var. *minor* S. 16.
46. *Cl. plicata* Dr. 32, am Rheindamm 1 Stück.

47. Succinea putris S. 32 h.
48. S. Pfeifferi R. 32.
49. Cyclostomus elegans M. 21 h.
50. Valvata piscinalis Nils. 32.
51. V. depressa Pf. 32 h.
52. Vivipara vera v. Frf. 32 h.
53. Vp. fasciata M. 30, ein gutes Exemplar, aber todt gefunden.
54. Bythina tentaculata L. 32 h.
55. Limneus stagnalis L. 32 h.
var. producta Colb. 32.
56. L. lagotis Schr. 32.
57. L. ovatus Dr., zwischen fig. 1254 und fig. 1258. Icon.
32 h.
58. L. palustris M. 32 h.
59. L. pereger M. 7.
60. Physa hypnorum L. 32 h.
61. Planorbis corneus L. 32 h.
62. Pl. marginatus Dr. 32 h.
63. Pl. carinatus M. 32.
64. Pl. vortex L. 32.
65. Pl. contortus L. 32.
66. Pl. glaber Jeff. 32.
67. Pl. nitidus M. 32.

Achill Andreæ, stud. rer. nat.

Aspergillum Kobeltianum n. sp.

Vagina mediocris, valde arcuata, inferne bulbaceo-inflata, ad discum coaretata, disco convexo, perforationibus numerosis, tubulosis, tubulis externis brevibus, fimbriam vix formantibus, fissura e centro usque ad peripheriam radiatim decurrente; ad extremitatem superiorem ad modum campanulae leviter dilatata, distinctissime et